

新刊王氏脉經

新刊正氏脉經卷第七

朝散大夫光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等類次

病不可發汗證第一

病可發汗證第二

病發汗以後證第三

病不可吐證第四

病可吐證第五

病不可下證第六

病可下證第七

病發汗吐下以後證第八

病用溫證第九

病不可灸證第十

病可灸證第十一

病不可刺證第十二

病可刺證第十三

病不可水證第十四

病可水證第十五

病不可火證第十六

病可火證第十七

熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證第十八

重實重虛陰陽相附生死證第十九

熱病生死期日證第二十

熱病十逆死日證第二十一

熱病五藏氣絕死日證第三十二

熱病至脉死日證第三十三

熱病損脉死日證第三十四

病不可發汗證第一

少陰病脉細沈數病爲在裏不可發其汗

脉浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中脉遲者不可發其汗何以知然此爲榮氣不足血微少故也

少陰病脉微而微一作濡不可發其汗無陽故也

脉濡而弱弱反在關濡反在顛微反在止澀反在下微則陽氣不足澀則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩澀則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠

動氣在右不可發汗發汗則咽而渴心苦煩飲即吐水

動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端

動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目運

惡寒食即反吐穀不得前

一二云穀不消化

咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣微絕手足逆冷欲得蹠

卧不能自溫

諸脉數動微弱並不可發汗發汗則大便難腹中乾

一二云小便難胞

中乾胃燥而煩其形相象根本異源

脉濡而弱弱反在關濡反在顛弦反在上微反在下弦為陽

運微為陰寒上實下虛意欲得溫微弦為虛不可發汗發汗

則寒慄不能自還然者則脈數吐涎沫咽中必乾小便不利

心中飢煩躁時而發其形似瘧有寒無熱虛而寒慄欬而發

汗蹇而苦滿一作痛腹中復堅

厥不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌萎穀不得前

諸逆發汗微者難愈劇者言亂睛眩者死命將難全太陽病得之八九日如瘧狀發熱而惡寒熱多寒少其人不嘔清便續自可一日再三發其脉微而惡寒此為陰陽俱虛不可復發汗也

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱則無陽也不可復發其汗咽乾燥者不可發汗

亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振

衄家不可攻其表汗出必額陷脉上促急而緊直視而不能眴不得眠

汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰痿可與禹餘糧圓

淋家不可發汗發其汗必便血

瘡家雖身疼痛不可攻其表汗出則痊

一作瘰下同

冬時發其汗必吐利口中爛生瘡

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

欬而小便利若失小便不可攻其表汗出則厥逆冷汗出多極發其汗亦堅

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後必熱厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發其汗必口傷爛赤病人脉數數為有熱當消穀引食反吐者醫發其汗陽微膈氣虛脉則為數數為客陽不能消穀胃中虛冷故令吐也傷寒四五日其脉沈煩而喘滿脉沈者病為在裏反發其汗津液越出大便為難表虛重發其汗則謬語

傷寒頭痛身熱發熱形象中風常微汗出又自嘔者下之益煩心懊憹如飢發汗則致痊身強難以屈伸者則發黃不得小便久則發欬唾

太陽病發其汗因致痊

傷寒脈弦細頭痛而反發熱此屬少陽少陽不可發其汗太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞堅者不可發其汗

少陰病欬而下利譫語者此被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出

一作耳

作者是爲下厥上竭爲難治

傷寒有五皆熱病之類也同病異名同脈異經病雖異傷寒

風其人自有痼疾則不得同法其人素傷於風因復傷於熱風熱相薄則發風溫四肢不收頭痛身熱常汗出不解浴在少陰厥陰不可發汗汗出譫言獨語內煩躁擾不得卧善驚目亂無精治之復發其汗如此者醫殺之也

傷寒濕溫其人常傷於濕因而中暍濕熱相薄則發濕溫病苦兩脛逆冷腹滿又背頭目痛苦妄言治在足太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暍如此者死醫殺之也

右一首
出醫律

病可發汗證第二

大法春夏宜發汗

凡發汗欲令手足皆周至熱熱一時間益佳但不欲如水流離若病不解當重發汗汗多則亡陽陽虛不得重發汗也

九服湯藥發汗中病便止不必盡劑也

凡云可發汗而無湯者圓散亦可用要以汗出爲解然不如湯隨證良

太陽病外證未解其脈浮弱當以汗解宜桂枝湯

太陽病脈浮而數者可發其汗屬桂枝湯證

陽明病脈遲汗出多微惡寒表爲未解可發其汗屬桂枝湯
夫病脈浮大問病者言但堅耳設利者爲虛大逆緊爲實汗
出而解何以故脈浮當以汗解

傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語弱者發熱脈
浮解之當汗出愈

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發熱此屬陽明脈浮
虛者當發其汗屬桂枝湯證

病常自汗出此爲榮氣和榮氣和而外不解此衛不和也榮行脉中爲陰主內衛行脉外爲陽主外復發其汗衛和則愈屬桂枝湯證

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈此衛氣不和也先其時發汗即愈屬桂枝湯證

脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯

太陽病不解熱結膀胱其人如強血必自下下者即愈其外未解者尚未可以當先解其外屬桂枝湯證

太陽病下之微喘者表未解故也屬桂枝加厚朴杏子湯證傷寒脉浮緊不發其汗因衄屬麻黃湯證

陽明病脉浮無汗其人必喘發其汗則愈屬麻黃湯證

太陰病脉浮者可發其汗屬桂枝湯證

太陽病脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解表候續在此當發其汗服湯微除發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也屬麻黃湯證

脉浮者病在表可發其汗屬桂枝湯證

一云麻黃湯

傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其大便反青一作小便

清此爲不在裏故在表也當發其汗頭痛者必衄屬桂枝湯證

下利後身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

太陽病頭痛發熱汗出惡風若惡寒屬桂枝湯證

太陽中風陽浮而陰濡弱浮者熱自發濡弱者汗自出當發

惡寒淅淅惡風翕翕發熱暈鳴乾嘔屬桂枝湯證

太陽病發熱汗出此爲榮弱衛強故使汗出欲救邪風屬桂枝

枝湯證

太陽病下之氣上衝可與桂枝湯不衝不可與之

太陽病初服桂枝湯而反煩不解者法當先刺風池風府却與桂枝湯則愈

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發背脈氣從少腹上衝心者灸其核上一壯與桂枝加桂湯

太陽病項背強几几反汗出惡風屬桂枝加葛根湯

太陽病項背強几几無汗惡風屬葛根湯

太陽與陽明合病而自利不嘔者屬葛根湯證

太陽與陽明合病不下利但嘔屬葛根加半夏湯

太陽病桂枝證醫反下之遂利不止其脈促者表未解喘而汗出屬葛根黃芩黃連湯

太陽病頭痛發熱身體疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘屬
麻黃湯證

太陽與陽明合病喘而實滿不可下也屬麻黃湯證

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁頭痛
屬大青龍湯脈微弱汗出惡風不可服之服之則厥筋惕肉
瞤此爲逆也

傷寒脈浮緩其身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍
湯發之

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或
小便利小腹滿或微喘屬小青龍湯

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已而渴者此寒
去欲爲解屬小青龍湯證

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通一作按鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後臃刺之小差外不解病過十日脉續浮與小柴胡湯但浮無餘證與麻黃湯不溺腹滿加噦不治

太陽病十日以去脉浮細嗜卧此爲外解設骨滿脇痛與小柴胡湯脉浮者屬麻黃湯證

中風往來寒熱傷寒五六日以後骨脇苦滿嘿嘿不欲飲食煩心喜嘔或脅中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞堅或心中悸小便不利或不渴外有微熱或欬者屬小柴胡湯

傷寒四五日身體熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴屬小柴胡湯證

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未

去者屬柴胡桂枝湯

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無證故微發汗也

脈浮小便不利微熱消渴與五苓散利小便發汗

病發汗以後證第三

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷不可下下之爲逆如此者可小發其汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不大徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗而不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐汗出而不徹故也更發其汗即愈何以知其汗不徹脈澀故以知之

未持脈時病人叉手自冒之師因教試令欬而不即欬者此必兩耳無所聞也所以然者重發其汗虛故也

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

發汗後水藥不得入口爲逆若更發其汗必吐下不止

陽明病本自汗出醫復重發其汗病已差其人微煩不了了此大便堅也以亡津液胃中乾燥故令其堅當問小便日幾行若本日三四行今日再行者必知大便不久出今爲小便數少津液當還入胃中故知必當大便也

發汗多又復發其汗此爲亡陽證語脈短者死脈自和者不死

傷寒發其汗身目爲黃所以然者寒濕相搏在裏不解故也病人有寒復發其汗胃中冷必吐衄

太陽病發其汗遂漏而不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸屬桂枝加附子湯

服桂枝湯大汗出黃脉但洪大與桂枝湯若其形如瘥一日再三發汗出便解屬桂枝二麻黃一湯

服桂枝湯大汗出大煩渴不解若脉洪大屬白虎湯

傷寒脉浮自汗出小便數煩復仲景煩復字作心煩微惡寒而脚掣急

反與桂枝欲攻其表得之便厥咽乾煩躁吐逆當作甘草乾

薑湯以復其陽厥愈足溫更作為藥甘草湯與之其脚即伸

而胃氣不和譫語可與承氣湯重發其汗復加燒針者屬四

逆湯

傷寒發汗已解半日許復煩其脉浮數可復發其汗屬桂枝

湯證

發汗後身體疼痛其脉沈遲屬桂枝加芍藥生薑人參湯

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱可以麻黃杏子

甘草石膏湯

發汗過多已後其人叉手自冒心心下悸而欲得按之屬桂枝甘草湯

發汗後其人臍下悸欲作貴脉屬茯苓桂枝甘草大棗湯

發汗後腹脹滿屬厚朴生薑半夏甘草人參湯

發其汗不鮮而反惡寒者虛故也屬芍藥甘草附子湯不惡

寒但熱者實也當和其胃氣宜小承氣湯

太陽病發汗若大汗出胃中燥煩不得眠其人欲飲水當稍

飲之令胃中和則愈

發汗已脉浮而數復煩渴者屬五苓散

傷寒汗出而渴屬五苓散證不渴屬茯苓甘草湯

太陽病發其汗汗出不解其人發熱心下悸頭眩身悶而動振振欲擗地屬真武湯

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞堅乾噦食臭脇下有水氣腹中雷鳴而利屬生薑瀉心湯

傷寒發熱汗出不解後心中痞堅嘔而下利屬大柴胡湯

太陽病二日發其汗不解蒸蒸發熱者屬於胃也屬承氣湯
大汗出熱不去內拘急四肢疼下利厥逆而惡寒屬四逆湯
發汗多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通
津液後自愈

病不可吐證第四

太陽病當惡寒而發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脈細

而數此醫吐之過也若得病一日二日吐之腹中飢口不能食三日四日吐之不喜糜粥飲食冷食朝食暮吐此醫吐之所致也此爲小逆

太陽病吐之者但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此爲吐之內煩也

少陰病飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲此皆中實不可下若膈上有寒飲乾嘔者不可吐當溫之

諸四逆厥者不可吐之虛家亦然

病可吐證第五

大法春宜吐

凡服湯吐中病便止不必盡劑也

病如桂枝證其頭不痛項不強寸口脈微細胃中痞堅氣上
撞咽喉不得息此爲胃有寒當吐之

病皆上諸實皆中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有濁
唾下利日十餘行其脈反遲寸口微滑此可吐之吐之利即止
少陰病飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐當遂吐之
食在上脘當吐之

病者手足厥冷脈乍緊邪結在胃中心下滿而煩飢不能食
病在胃中當吐之

病不可下證第六

脈濡而弱弱反在關濡反在顛微反在上澀反在下微則陽
氣不足澀則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩澀則無血
脈而且寒陽微不可下下之則心下痞堅

動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥暈乾頭眩心悸
動氣在左不可下下之則腹裏拘急食不下動氣反劇身雖
有熱卧反欲踰

動氣在上不可下下之則掌握熱煩身浮冷熱汗自泄欲水
自濯

動氣在下不可下下之則腹滿卒起頭眩食則下清穀心下
痞堅

咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下卧則欲踰身
體急痛復下利日十數行

諸外實不可下下之則發微熱亡脉則厥當臍握熱

諸虛不可下下之則渴引水者易愈惡水者劇

脉濡而弱弱反在關濡反在顛弦反在上微反在下弦為陽

運微爲陰寒上實下虛意欲得溫與弦爲虛虛者不可下微則爲欬欬則吐涎沫下之欬則止而利不休胃中如蟲齧弱入則出小便不利兩脇拘急喘而息爲難頸背相牽臂則不仁極寒反汗出軀冷若冰眼睛不慧語言不休穀氣多入則爲除中口雖欲言舌不得前

脈濡而弱弱反在關濡反在顛浮反在上數反在下浮則爲陽虛數則爲無血浮則爲虛數則生熱浮則爲虛自汗而惡寒數則爲痛振而寒慄微弱在關芤下爲急喘汗不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相搏其形如癰醫反下之令脈急數發熱狂走見鬼心下爲痞小便淋瀝少腹甚堅小便血也脈濡而略濡則陽氣微緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡寒榮緊胃氣冷微軀心內煩醫以爲大熱鮮肌而發汗亡陽

虛煩躁心下苦痞堅裏裏俱虛竭卒起而頭眩客熱在皮膚
悵快不得眠不知冒氣冷緊寒在關元技巧無所施汲水灌
其身客熱應時罷慄慄而振寒重被而覆之汗出而冒顛體
惕而又振小便爲微難寒氣因水發清穀不容間嘔變反腸
出顛倒不得安手足爲微逆身冷而內煩遲欲從後救安可
復追還

脈浮而大浮爲氣實大爲血虛血虛爲無陰孤陽獨下陰部
小便難胞中虛今反小便利而大汗出法衛家當微今反更
實津液四射榮竭血盡干煩不眠血薄肉消而成暴液醫復
以毒藥攻其胃此爲重虛客陽去有期必下如污泥而死
跌陽脈遲而緩胃氣如經跌陽脈浮而數浮則傷胃數則動
脾此非本病醫特下之所爲也榮衛內陷其數先微脈反但

浮其人必堅氣噫而除何以言之脾脉本緩今數脉動脾其數先微故知脾氣不治大便堅氣噫而除今脉反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴數脉當遲緩脉因前後度數如前仲景前字作法病者則飢數脉不時則生惡瘡脉數者久數不止止則邪結正氣不能復正氣却結於藏故邪氣浮之與皮毛相得脉數者不可下下之必煩利不止少陰病脉微不可發其汗無陽故也陽已虛尺中弱澀者復不可下之

脉浮大應發其汗醫反下之此為大逆

脉浮而大心下反堅有熱屬藏攻之不全微汗屬府澀數則堅汗多即愈汗少便難脉遲尚未可攻

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出後不徹因轉屬陽

明欲自汗出不惡寒若太陽證不罷不可下下之爲逆
結胸證其脉浮大不可下下之即死

太陽與陽明合病喘而胸滿不可下之

太陽與少陽併病心下痞堅頸項強而眩勿下之

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

病欲吐者不可下之

太陽病有外證未解不可下下之爲逆

病發於陽而反下之熱入因作結胸發於陰而反下之因作
痞痞脉浮堅而下之緊反入裏因作痞

夫病陽多者熱下之則堅

本虛攻其熱必噦

無陽陰強而堅下之必清穀而腹滿

大陰之爲病腹滿而吐食不下下之益甚腹時自痛肯下結
堅

厥陰之爲病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食甚者則欲
吐下之不肯止

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之
手足寒脈弦遲此胃中實不可下也

傷寒五六日不結省腹滿脈虛復厥者不可下下之亡血死
傷寒發熱但頭痛微汗出發其汗則不識人熏之則喘不得
小便心腹滿下之則短氣而腹滿小便難頭痛背強加溫針
則必衄

傷寒其脈陰陽俱緊惡寒發熱則脈欲厥厥者脈初來大漸
漸小更來漸大是其脈也惡寒甚者身重汗出喉中痛熱多

者目赤睛不慧豎復發之咽中則傷若復下之則兩目閉塞
多清穀熱多便膿血熏之則發黃熨之則咽燥小便利者可
救難者必危殆

傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃鼻衄不可制貪水者必
嘔惡水者厥下之咽中生瘡假令手足溫者下重便膿血頭
痛目黃者下之目閉貪水者下之其脉必厥其聲啞咽喉塞
發其汗則戰慄陰陽俱虛惡水者下之裏冷不嗜食大便完
穀出發其汗口中傷舌上胎滑煩躁脉數實不大便六七日
後必便血復發其汗小便即自利

得病二三者脉弱無太陽柴胡證而煩躁心下堅至四日雖
能食以承氣湯少與微和之令小安至六日與承氣湯一升
不大便六七日小便少者雖不大便但頭堅後澼未定成其

堅攻之必溏當須小便利定堅乃可攻之

藏結無陽證寒而不熱

傷寒論云不往來寒熱

其人反靜舌上胎滑者

不可攻也

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅不可與若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可少與小承氣湯腹中轉失氣者此爲有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但頭堅後溏不可攻之攻之必腹滿不能食飲水者即噦其後發熱者必復堅以小承氣湯和之若不轉失氣者慎不可攻之

陽明病身含色赤者不可攻也必發熱色黃者小便不利也陽明病當心下堅滿不可攻之攻之遂利不止者死止者愈陽明病自汗出若發其汗小便自利此爲內竭雖堅不可攻

之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及猪膽汁皆可以導

下利其脉浮大此爲虛以強下之故也設脉浮革因爾腸鳴屬當歸四逆湯

病可下證第七

大法秋宜下

九可下者以湯勝圓散中病便止不必盡三服

陽明病發熱汗多者急下之屬大柴胡湯

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之屬承氣湯

少陰病六七日腹滿不大便者急下之屬承氣湯證

少陰病下利清水色青者心下必痛口乾燥者可下之屬大

柴胡湯承氣湯證

下利三部脉皆平按其心下堅者可下之屬承氣湯證

陽明與少陽合病而利脉不負者為順負者失也互相刻賊為負

滑而數者有宿食當下之屬大柴胡承氣湯證

傷寒後脉沈沈為內實

王陽云脉沈實

下之解屬大柴胡湯證

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難微熱者

此為實急下之屬大柴胡湯承氣湯證

太陽病未解其脉陰陽俱沈必先振汗出解但陽微者先汗

之而解但陰微者先下之而解屬大柴胡湯證

陰微一作尺實

脉雙弦遲心下堅脉大而緊者陽中有陰可下之屬承氣湯證

結胸者項亦強如柔瘥狀下之即和

病者無表裏證發熱七八日雖脉浮數可下之屬大柴胡湯證

太陽病六七日表證續在其脉微沈反不結背其人發狂此熱在下焦少腹當堅而滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯

太陽病身黃其脉沈結少腹堅小便不利爲無血小便自利其人如狂者血證諦屬抵當湯證

傷寒有熱而少腹滿應下便利今反利者此爲血當下之屬抵當圓證

陽明病發熱而汗出此爲熱越不能發黃但頭汗出其身無有齊頸而還小便不利渴引水漿此爲瘀熱在裏身必發黃屬茵陳蒿湯

陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘雖堅大便必黑屬抵當湯證澤出而證語者有燥屎在胃

中此風也過經乃可下之下之若早語言亂以表虛裏實故也下之則愈屬大柴胡湯承氣湯證

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日脯所發者屬陽明脉實者當下之屬大柴胡湯承氣湯證

陽明病證語有潮熱而反不能食者必有燥屎五六枚若能食者但堅耳屬承氣湯證

太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞堅滿引腰下痛嘔則短氣汗出不惡寒此爲表解裏未和屬十棗湯

太陽病不解熱結勝託其人如狂血自下下之即愈其外未解尚未可攻當先解外解外解小腹急結者乃可攻之屬桃人承氣湯

傷寒七八日身黃如橘小便不利少腹微滿屬因陳高湯證
傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱屬大柴胡湯證但結胃
無大熱此爲水結在胃脇頭微汗出與大陷胃湯

傷寒六七日結胸熱實其脈沈緊心下痛按之如石堅與大
陷胃湯

陽明病其人汗多津液外出胃中燥大便必堅堅者則譫語
屬承氣湯證

陽明病不吐下而心煩者可與承氣湯

陽明病其脈遲雖汗出而不惡寒其體_{一作本}必重短氣腹滿
而喘有潮熱如此者其_{一作其}爲_{一作其}難可攻其裏若手足濇然汗出
者此大便已堅屬承氣湯其熱未潮未可與承氣湯若腹滿
大而不大便者屬小承氣湯_{一作和胃湯}勿令至大下

陽明病譫語發潮熱其脉滑疾如此者屬承氣湯因與承氣湯一升腹中轉失氣者復與一升如不轉失氣者勿更與之明日又不大便脉反微澀者此為裏虛為難治不可更與承氣湯

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足絳汗出大便難而譫語者下之愈屬承氣湯證

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也屬承氣湯證

病發汗吐下以後證第八

師曰病人脉微而澀者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒而發熱無休止時夏月盛熱而與仲作著複衣冬月盛寒而與絺綌其體所以然者陽微即寒

寒陰弱即發熱故仲景發其汗使陽氣微又太下之令陰氣

弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故

與仲景著複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內

弱不能勝熱故與仲景裸其體又陰脈遲澀故知亡血

太陽病三日已發其汗吐下溫針而不解此爲壞病桂枝復

不中與也觀其脈證知犯何逆隨證而治之

脈浮數法當汗出而愈而下之則身體重心悸不可發其汗

當自汗出而解所以然者尺中脈浮此裏虛須表裏實津液

和即自汗出愈

凡病若發汗若吐若下若亡血無津液而陰陽自和者自愈

大下後發汗其人小便不利此亡津液勿治其小便利必自愈

下以後復發其汗必振寒又其脈微細所以然者內外俱虛

故也

太陽病先下而不愈因復發其汗表裏俱虛其人因冒冒家
當汗出自愈所以然者汗出表和故也表和然後下之

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫再三下之不能多
作食其人脇下滿面目及身黃頸項強小便難與柴胡湯後
必下重木渴飲水而嘔柴胡湯復不中與也食穀者噦

太陽病二三日終不能卧但欲起者心下必結其脈微弱者
此本寒也而反下之利止者必結脅未止者四五日復重下
之此挾熱利也

太陽病下之其脈促不結脅者此爲欲鮮其脈浮者必結脅
其脈緊者必咽痛其脈弦者必兩脇拘急其脈細而數者頭
痛未止其脈沉而緊者必欲嘔其脈沉而滑者挾熱利其脈

浮而滑者必下血

太陽少陽併病而反下之成結脅心下堅下利不復止水漿不肯下其人必心煩

脈浮緊而下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

傷寒吐下發汗虛煩脈其微八九日心下痞堅脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕者久而成瘕

陽明病不能食下之不鮮其人不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也

陽明病脈遲食難用飽飽即發煩頭眩者必小便難此欲作穀疸雖下之其腹滿如故耳所以然者脈遲故也

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱而汗出復惡寒不嘔但心下痞者此爲醫下之也

傷寒大吐大下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

吐下發汗後其人脉平而小煩者以新虛不勝穀氣故也

太陽病醫發其汗遂發熱而惡寒復下之則心下痞此表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加火針因而煩面色青黃膚潤如此者爲難治今色微黃手足溫者易愈

服桂枝湯下之頭項強痛鼻翕發熱無汗心下滿微痛小便不利屬桂枝去桂加茯苓白朮湯

太陽病先發其汗不解而下之其脉浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脉浮故在外當解其外則愈屬桂枝湯下以後復發其汗者則晝日煩躁不眠夜而安靜不嘔不渴而無表證其脉沈微身無大熱屬乾姜附子湯

傷寒吐下發汗後心下逆滿氣上撞背起即頭眩其脈沈緊發汗即動經身為振搖屬茯苓桂枝木甘草湯

發汗吐下以後不解煩躁屬茯苓四逆湯

傷寒發汗吐下後虛煩不得眠劇者反覆顛倒心中懊憹屬梔子湯若少氣梔子甘草湯若嘔梔子生薑湯若腹滿者梔子厚朴湯

發汗若下之煩熱背中塞者屬梔子湯證

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而背脊中痛大便反溏其腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐下者與承氣湯不尔者不可與欲嘔背脊中痛微溏此非柴胡湯證以嘔故知極吐下也

太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近屬大陷胸湯

傷寒五六日其人已發汗而復下之腎脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此爲未解屬柴胡桂枝乾姜湯

。傷寒汗出若吐下解後心下痞堅噫氣不除者屬旋代赭湯。
。大下已後不可更行桂枝湯汗出而喘无大熱可以麻黃杏仁甘草石膏湯

。傷寒大下后復發其汗心下痞惡寒者表未解也不可攻其痞當先解表表解乃攻其痞解表屬桂枝湯攻痞屬大黃黃連瀉心湯

傷寒吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時二惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升屬白虎湯

傷寒吐下後未解不大便五六日至十餘日其人日晡所發

潮熱不惡寒獨語如見鬼神之狀若劇者發則不識人循衣妄撮怵惕不安微喘直視脉弦者生澁者死微者但發熱譫語屬承氣湯若下者勿復服

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺溺發汗則譫語下之則額上生汗手足厥冷自汗屬白虎湯證

陽明病其脉浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出而不惡寒反偏惡熱其身軀重發其汗即躁心煩二而反譫語加溫針必怵惕又煩躁不得眠下之即胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者屬梔子湯證

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊懣若飢不能食但頭汗出屬梔子湯證

陽明病下之心中懊懣而煩胃中有燥屎者可攻其人腹微

滿頭堅後溘者不可下之有燥屎者屬承氣湯證

太陽病吐下發汗後微煩小便數大便因堅可與小承氣湯和之則愈

大汗若大下而厥冷者屬四逆湯證

太陽病下之其脉促而滿者屬桂枝去芍藥湯若微寒屬桂枝去芍藥加附子湯

傷寒五六日大下之身熱不去心中結痛者未欲解也屬梔子湯證

傷寒下後煩而腹滿卧起不安屬梔子厚朴湯

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩屬梔子乾姜湯

傷寒醫下之續得下利清穀不止身熱疼痛急當救裏身熱

疼痛清便自調急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

太陽病過經十餘日反再三下之後四五日柴胡證續在先
與小柴胡湯止小安嘔不止心下急其人噤二微煩者爲
未解與大柴胡湯下者止

傷寒十三日不解胃脘滿而嘔日晡所發潮熱而微利此本
當柴胡湯下之不得利今反利者故知醫以丸藥下之非其
治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後屬柴胡加
芒硝湯

傷寒十三日過經而譫語內有熱也當以湯下之小便利者
大便當堅而反利其脉調和者知醫以丸藥下之非其治也
自利者其脉當微厥今反和者此爲內實屬承氣湯證

傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利譫語一身不可轉側
屬柴胡加龍骨牡蠣湯

少陰病下利便膿血者可刺

婦人傷寒懷身腹滿不得小便加從腰以下重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺寫勞宮及關元小便利則愈

傷寒喉痺刺手少陰少陰在腕當小指後動脈是也針入三分補之

問曰病有汗出而身熱煩滿煩滿不爲汗解者何對曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥也太陽主氣故先受邪少陰與爲表裏也得熱則上從之從之則厥治之表裏刺之飲之湯

熱病三日氣口靜人迎躁者取之諸陽五十九刺以瀉其熱而出其汗實其陰以補其不足所謂五十九刺者兩手外內

側各三九十二疳五指間各一九八疳足亦如是頭入髮一寸傍三分各三九六疳更入髮三寸邊各五九十疳耳前後口下項中各一九六疳顙上一

熱病先膚痛窒鼻充面取之皮以第一針五十九可齒為軫

一二下

可軫鼻索皮於肺不得索之火火心也

熱病嗑乾多飲善驚臥不能安取之膚肉以第六針五十九目皆赤索肉於脾不得索之木木肝也

熱病而肯脇痛手足躁取之筋間以第四針針於四達

一作通

筋辟目浸索筋於肝不得索之金金肺也

熱病數驚癎癎而狂取之脉以第四針急寫有餘者癎疾毛髮去索血

一竹

於心不得索之水水腎也

熱病而身重骨痛耳聾而好瞑取之骨以第四針五十九骨

病食齧牙齒耳清索骨於腎無一本不得索之土土脾也

熱病先身濇傍數傍數太煩悶乾脅啞取之以第一針五十

九膚脹口乾寒汗

熱病頭痛一作目脈緊善衄厥熱也取之以第三針視

有餘不足寒熱病

熱病體重腸中熱取之以第四針於其輸及下諸指間索氣

於胃絡得氣也

熱病使臍痛急腎脇支滿取之湧泉與太陰陽明一二云陰以

第四針針啞裏

熱病而汗且出反脈順可汗者取之魚際太淵大都太白寫

之則熱去補之則汗出汗出太甚者取踝上橫文以止之

熱病七日八日脈口動喘而眩者急刺之汗且自出凌刺手

大指間

熱病先脊脇痛手足躁刺足少陽補手太陰病甚為五十九刺

熱病先手臂痛刺手陽明太陰而汗出止

熱病始於頭首者刺項太陽而汗出止

熱病先身重骨痛耳聾目瞑刺足少陰病甚為五十九刺

熱病先眩冒而熱脊脇痛刺足少陰少陽

熱病始足脛者先取足陽明而汗出

病不可水瀉第十四

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

傷寒大吐大下之極虛復極汗者其人外氣拂鬱復與之水以發其汗因得嘔所以然者胃中寒冷故也

病不可灸證第十

微數之脉慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實血散脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

脉浮當以汗解而反灸之邪無從去因火而盛病從腰以下必當重而痺此爲火逆若欲自解當先煩煩乃有汗隨汗而解何以知之脉浮故知汗出當解

脉浮熱甚而灸之此爲實實以虛治因火而動咽燥必唾血

病可灸證第十一

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發背脉氣從少腹上撞者灸其核上一壯一本作各一壯與桂枝加桂湯

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之

少陰病其人吐利手足不逆反發熱不死脉不至者灸其少

陰七壯

少陰病下利脉微澀者即嘔汗出必數更衣反少當溫其上

灸之

一云灸厥陰可五十壯

諸下利皆可灸足大都五壯

一云七壯

商丘陰陵泉皆三壯

下利手足厥無脉灸之不溫反微喘者死少陰負趺陽者為

順也

傷寒六七日其脉微手足厥煩躁灸其厥陰厥不還者死

傷寒脉促手足厥逆可灸之為可灸少陰厥陰主逆

病不可刺證第十二

大怒無刺

大作新

已刺無怒

一作新

新內無刺

已刺無以

大勞無刺

一作新

已刺無勞

大醉無刺

已刺無醉

大飽無刺

已刺無飽

大飢無刺

已刺無飢

大渴無刺

已刺無渴

無刺大驚

無刺熇熇之熱無刺漉漉之汗無刺渾渾之脉身熱甚陰陽皆爭者勿刺也其可刺者急取之不汗則洩所謂勿刺者有死徵也無刺病與脉相逆者上工刺未生其次刺未盛其次刺已衰粗工逆此謂之伐形卷九

病可刺證第十三

太陽病頭痛至七日自當愈其經竟故也若欲作再經者當針足陽明使經不傳則愈

太陽病初服桂枝湯而反煩不解者當先刺風池風府乃却與桂枝湯則愈

傷寒腹滿而譫語寸口脉浮而緊者此爲肝乘脾也縱當刺

期門

傷寒發熱啗啗惡寒其人大渴欲飲酢漿者其腹必滿而自汗出小便利其病欲解此爲肝乘肺名曰橫當刺期門

陽明病下血而譫語此爲熱入血室但頭汗出者當刺期門隨其實而瀉之澱然汗出者則愈

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲身涼背脇下滿如結脊狀其人譫語此爲熱入血室當刺期門隨其虛實而取之平病云熱入血室無犯胃氣及上三焦與此相反豈謂藥不謂針耶

太陽與少陽併病頭痛頸項強而眩時如結脊心下痞堅當刺大杼第二間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則譫語譫語則脈弦譫語五日不止當刺期門

更發熱而躁煩也

傷寒脉浮而盤以火迫劫之亡陽驚狂卧起不安厲桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

問曰得病十五十六日身熱黃下利狂欲走師脉之言當下清血如豚肝乃愈後如師言何以知之師曰寸口脉陽浮陰濡弱陽浮則爲風陰濡弱爲少血浮虛受風少血發熱惡寒洒淅項強頭眩盤加火熏鬱令汗出惡寒遂甚客熱因火而發怫鬱蒸肌膚身目爲黃小便微難短氣從鼻出血而復下之胃无津液泄利遂不止熱瘀在膀胱畜結成積聚狀如豚肝當下未下心亂迷憤狂走赴水不能自制畜血若去目明心了此皆鑿所爲无他禍患微輕得愈極者不治

傷寒其脉不弦緊而弱者必渴被火必譫言弱者發熱脉浮

解之當汗出愈

太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必有清血

陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黃

陽明病其脈浮緊咽乾口腹滿而喘發熱汗出而不惡寒反
偏惡熱其身軀重發其汗則躁心憤二而反譫語加溫針必
怵惕又煩躁不得眠

少陰病欬而下利譫語是爲被火氣劫故也小便必難爲強
責少陰汗出

太陽病二日而瘥至發其背大汗出火氣入胃胃中竭燥必
發譫語十餘日振而反汗出者此爲欲解其汗從腰以下不
得汗其人欲小便反不得嘔欲失溲足下惡風大便堅者小
便當數而反不數及多便已其頭卓然而痛其人足心必熱

穀氣下流故也

病可火證第十七

下利穀道中痛當溫之以爲宜熬末鹽熨之一方炙枳實熨之。熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭尽生死證第十八問曰溫病汗出輒復熱而脉躁疾不爲汗衰狂言不能食病名爲何對曰名曰陰陽交交者死人所以汗出者生於穀穀生於精今邪氣交爭於胃肉而得汗者是邪却而精勝精勝則當能食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者邪勝也不能食者精无裨也汗而熱留者壽可立而傾也。

夫汗出而脉尚躁盛者死此今脉不与汗相應此不勝其病也狂言者是失志失志者死有三死不見一生雖愈必死

熱病已得汗而脈尚躁盛此陽脈之極也死其得汗而脈靜者生也

熱病脈尚躁盛而不得汗者此陽脈之極也死脈躁盛得汗者生也

熱病已得汗而脈尚躁喘且復熱勿膚刺喘甚者死

熱病陰陽交者死

熱病煩已而汗脈當靜

太陽病脈反躁盛者是陰陽交死復得汗脈靜者生

熱病陰陽交者熱煩身躁大陰寸口脈兩衝尚躁盛是陰陽交死得汗脈靜者生

熱病陽進陰退頭獨汗出死陰進陽退腰以下至足汗出亦死陰陽俱進汗出已熱如故亦死陰陽俱退汗出已寒慄不

陽明病潮熱微堅可以承氣湯不堅勿與之若不大便六七
日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中不轉失氣者
此爲但頭堅後溏不可攻之攻之必腹滿不能食欲飲水者
即噦

陽明病若胃中虛冷其人不能食飲水即噦

下利其脈浮大此爲虛以強下之故也設脈浮革因爾腸鳴
當溫之與水即噦

病在陽當以汗解而反以水噦之若灌之其熱却不得去益
煩皮上粟起意欲飲水反不渴宜文蛤散示不差與五苓散
若寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯曰散亦可身熱皮
粟不解欲引衣自覆若以水噦之洗之益令熱却不得出當
汗而不汗即煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

寸口脉浮大醫反下之此爲大逆浮即無血大即爲寒寒氣相搏即爲腸鳴醫乃不知而反飲水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人即餒

寸口脉濡而弱濡即惡寒弱即發熱濡弱相搏藏氣衰微皆中苦煩此非結熱而反薄舌水漬布冷銚貼之陽氣遂微諸府無所依陰脉凝聚結在心下而不肯移胃中虛冷水穀不化小便縱通復不能多微則可救聚寒心下當柰何也

病可水證第十五

太陽病發汗後若大汗出胃中乾燥煩不得眠其人欲飲水當稍飲之令胃中和則愈

厥陰病渴欲飲水者與水飲之即愈太陽病寸口緩關上小浮尺中弱其人發熱而汗出復惡寒不嘔但心下痞者此爲

醫下也若不下其人復不惡寒而渴者爲轉屬陽明小便數者大便即堅不更衣十日無所苦也欲飲水者但與之當以法救渴宜五苓散

寸口脈洪而大數而滑洪大則榮氣長滑數則胃氣實榮長則陽盛怫鬱不得出身胃實則堅難大便則乾燥三焦閉塞津液不通醫發其汗陽盛不周復重下之胃燥熱畜大便遂損小便不利榮衛相搏心煩發熱兩眼如火鼻乾面赤舌燥齒黃焦汝大渴過經成壞病針藥所不能制與水灌枯槁陽氣微散身寒溫衣覆汗出表裏通然其病即除形脉多不同此愈非法治但醫所當慎妄犯傷榮衛

霍亂而頭痛發熱身痛疼痛熱多欲飲水屬五苓散

嘔吐而病在膈上後必思水者急與猪苓散飲之水亦得也

病不可火證第十六

太陽中風以火却發其汗邪風被火熱血氣流洩失其常度
兩陽相熹灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛小便難陰陽俱虛
竭身體則枯燥但頭汗出齊頸而還復滿而微喘口乾咽爛
或不大便又則譫語甚者至噦手足躁擾循衣摸床小便利
者其人可治

太陽病醫發其汗遂發熱而惡寒復下之則心下痞此表裏
俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加火針因而煩面色青黃
膚瞤如此者爲難治今色微黃手足溫者愈

傷寒加溫針必驚

陽脉浮陰脉弱則血虛血虛則筋傷筋傷則脉沈者榮氣微也其
脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也榮氣微加燒針血留不行

脈實滿手足寒頭熱者春秋則生冬夏則死脈浮而瀦瀦而身有熱者死絡氣不足經氣有餘脈熱而尺寒秋冬爲逆春夏爲順經虛絡滿者尺熱滿而寒瀦春夏死秋冬生絡滿經虛灸陰刺陽經滿絡虛刺陰灸陽

問曰秋冬無極陰春夏無極陽何謂也對曰無極陽者春夏無數虛陽明陽明虛則狂無極陰者秋冬無數虛太陰太陰虛則死

右重寶
車虛部

熱病所謂陽附陰者腰以下至足熱腰以上至寒陰氣下爭還心腹滿者死所謂陰附陽者腰以上至頭熱腰以下至寒陽氣上爭還得汗者生

右陰陽
相附部

熱病生死期日證第二十

太陽之脈色赤額骨熱病也榮未大曰今且得汗待時自已

與厥陰脉爭見者死期不過三日其熱病氣內連腎少陽之
脉色榮頰前熱病也榮未天曰今且得汗待時自己與少陰
脉爭見者死期不過三日

熱病七八日脉微小病者溲血口中乾一日半而死脉代者
一日死

熱病七八日脉不躁喘不數後三日中有汗三日不汗四日
死未曾汗勿膚刺膚刺一作汗

熱病三四日脉不喘其動均者身雖煩熱今自得汗生傳曰
始府入藏終陰復還陽故得汗

熱病七八日脉不喘其動均者生微熱在陽不入陰今自汗也
熱病七八日脉不喘其動數均者病當瘥期二日不得汗四日死
熱病身面盡黃而腫心熱口乾舌卷焦黃黑身麻臭伏毒傷

肺中脾者死

熱病瘈瘲狂言不得汗瘈瘲不止伏毒傷肝中膽者死

熱病汗不出出不至足嘔膽吐血善驚不得卧伏毒在肝腑

足少陽者死

熱病十逆死證第二十一

熱病腹滿腹脹身熱者不得大小便脉濡小疾一逆見死

熱病腸鳴腹滿四肢清泄注脉浮大而洪不已二逆見死

熱病大衄不止腹中痛脉浮大絕喘而短氣三逆見死

熱病嘔且便血奪形肉身熱甚脉絕動疾四逆見死

熱病欬喘悸眩身熱脉小疾奪形肉五逆見死

熱病腹大而脹四肢清奪形肉短氣六逆見一旬內死

熱病腹脹便血脉大時時小絕汗出而喘口乾舌焦視不見

人七逆見一旬死

熱病身熱甚脈轉小欬而便血目眵陷妄言手循衣縫口乾躁擾不得卧八逆見一時死

熱病瘕瘕狂走不能食腹滿脅痛引腰臍背嘔血九逆見一時死

熱病嘔血喘欬煩滿身黃其腹鼓脹泄不止脈絕十逆見一時死

熱病五藏氣絕死日證第二十二

熱病肺氣絕喘逆欬唾血手足腹腫面黃振慄不能言語死魄與皮毛俱去故肺先死丙日篤丁日死

熱病脾氣絕頭痛嘔宿汁不得食嘔逆吐血水漿不得入狂言譫語腹大滿四肢不收意不樂死脈與肉氣俱去故脾先

止暈口氣冷亦死

右熱病陰陽交部

熱病所謂并陰者熱病已得汗因得泄是謂并陰故治

熱病所謂并陽者熱病已得汗脉尚躁盛大熱汗出雖不汗

出者衄是謂并陽故治

右熱病并陰陽部

少陰病惡寒踈而利手足逆者不治

少陰病下利止而眩時時自胃者死

少陰病其人吐利躁逆者死

少陰病四逆惡寒而踈其脉不至其人不煩而躁者死

少陰病六七日其人息高者死

少陰病脉微細沈但欲卧汗出不煩自欲吐五六日自利復

煩躁不得卧寐者死

少陰病下利若利止惡寒而踈手足溫者可治

少陰病惡寒而踈時時自煩欲去其衣被者可治

少陰病下利止厥逆無脉干煩

一本作乾嘔

服湯藥其脉暴出者

死微細者生

右少陰部

傷寒六七日其脉微手足厥煩躁灸其厥陰厥不還者死

傷寒下利厥逆躁不能卧者死

傷寒發熱下利至厥不止者死

傷寒厥逆六七日不利便發熱而利者生其人汗出利不止

者死但有陰無陽故也

傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者不可下下之亡血死

傷寒發熱而厥七日内利者為難治

右陽明部

熱病不知所痛不能自收口乾陽熱其陰頗有寒者熱在骨

死不治

熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜欲飲不止腹大而脹尚不厭飲目無精光死不治

脾傷即中風陰陽氣別離陰不從陽故以三分候其死生傷寒欬逆上氣其脈散者死謂其人形損故也

傷寒下利日十餘行其人脈反實者死

病者脇下素有痞而下在臍傍痛引少腹入陰俠陰筋此爲臧結死

夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲者重語是也直視譫語喘滿者死若下利者亦死

結胸證悉具而躁者死

吐舌下卷者死唾如膠者難鮮舌頭四邊徐有津液此爲欲鮮病者至經止脣有色脈和爲欲鮮色急者來鮮方陰陽

重實重虛陰陽相附生死證第十九

問曰何謂虛實對曰邪氣盛則實精氣奪則虛重實者肉大熱病氣熱脉滿是謂重實

問曰經絡俱實何如對曰經絡皆實是寸脉急而尺爲也皆當俱治故曰滑則順瀉則逆夫虛實者皆從其物類始五藏骨肉滑利可以長久寒氣蒸上脉滿實實而滑順則生實而瀉逆則死形盡滿脉急大堅尺滿而不應順則生逆則死所謂順者手足溫所謂逆者手足寒也

問曰何謂重虛對曰脉虛氣虛尺虛是謂重虛也所謂氣虛者言無常也尺虛者行步匡然也脉虛者不象陰也如此者滑則生瀉則死氣虛者肺虛也氣逆者足寒也非其時則生當其時則死餘藏皆如此也

太陽病發熱無汗而反惡寒者名剛瘧

太陽病發熱汗出而不惡寒者名柔瘧

太陽病發熱其脈沈而細者為瘧

太陽病發其汗因致瘧

論云發其汗太多因致瘧

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動

搖者為瘧

論云獨頭而搖卒口震背反張者瘧病也

太陽病無汗而小便反少氣上衝胃口噤不得語欲作剛瘧

葛根湯主之

剛瘧為病骨滿口噤臥不著席脚攣急其人必齟齬可與大

承氣湯

瘧病發其汗已其脈冷冷如蛇暴腹脹大者為欲解脈如故

反伏弦者必瘧

一云瘧脈出欲已

痊脉來按之築築而弦直上下行

痊家其脉伏堅直上下

夫風病下之則痊復發其汗必拘急

太陽病其證備身體強几几然脉沈遲此為痊括樓桂枝湯主之

痊病有灸瘡難療

瘡家雖身疼痛不可發其汗汗出則痊

太陽病關節疼痛脉沈而緩者為中濕論云中濕為濕痺之候其大小便不利大

便反快但當利其小便

病者一身盡疼二云發熱日晡即劇此為風濕汗出所致也

論云此病傷於汗出當風或久傷取冷所致

濕家之為病一身盡疼發熱而身色熏黃也

濕家之爲病其人但頭汗出而背強欲得被覆向火若下之
早則噦或腎滿小便利不利一云舌上如胎此爲丹田有熱腎上
有寒渴欲飲而不能飲則口燥也

濕家下之額上汗出微喘小便利不利一云者死若下利不止者
亦死

問曰風濕相搏身體疼痛法當汗出而解值天陰雨不止師
云此可發汗而其病不愈者何也荅曰發其汗汗大出者但
風氣去濕氣續在是故不愈若治風濕者發其汗微微似欲
出汗首則風濕俱去也

濕家身煩疼可與麻黃湯加朮四兩發其汗爲宜慎不可以
火攻之

風濕脈浮身重汗出惡風者防己湯主之

病人喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在
頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中即愈論云濕家病身疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩
傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脉
浮虛而澀者桂枝附子湯主之若其人大便鞭小便自利者
朮附子湯主之

風濕相搏骨節疼煩制痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣
小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

太陽中熱暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也白虎湯主之
太陽中暍身熱疼痛而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮膚
中所致也瓜蒂湯主之

太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細乳遲小便已洒
洒然毛聳手足逆冷小有勞身熱口前開板齒燥者發其汗

死甲日篤一日死

熱病心主氣絕煩滿骨痛

一作瘕

噤腫不可咽欲飲不能飲歌

哭而笑死神與榮脉俱去故心先死壬日篤癸日死

熱病肝氣絕僵仆足不安地嘔血恐懼酒漸惡寒血妄出遺

尿溺死魄與筋血俱亡故肝先死庚日篤辛日死

熱病腎氣絕喘悸吐逆腫疽屍癰目視不明骨痛短氣喘滿

汗出如珠死精與骨髓俱亡故腎先死戊日篤己日死

故外見腫子青小爪甲枯髮墮身澀齒挺而垢人皮面厚塵

黑欬而唾血渴欲數飲大滿此五藏絕表病也

熱病至脉死日證第二十二

熱病脉四至三日死脉四至者平人一至病人脉四至也

熱病脉五至一日死時一大至半日死忽忽悶亂者死

熱病脉六至半日死忽急疾大至有頃死

熱病脉損日死證第二十四

熱病脉四損三日死所謂四損者平人四至病人脉一至名

曰四損

熱病脉五損一日死所謂五損者平人五至病人脉一至名

曰五損

熱病脉六損一時死所謂六損者平人六至病人脉一至名

曰六損若絕不至或久乃至立死

治傷寒形證所宜進退 王叔和集仲景評脉要論

新刊王氏脉經卷第七